

**Prospect: Informații pentru utilizator**

**PANANGIN 158 mg/140 mg comprimate filmate**  
aspartat de potasiu anhidru/ aspartat de magneziu anhidru

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Panangin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Panangin
3. Cum să utilizați Panangin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Panangin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Panangin și pentru ce se utilizează**

Substanțele active din Panangin comprimate filmate joacă un rol important în diferite procese metabolice, precum și în funcționarea sistemului nervos, muscular, inimă și sistemul circulator. Acest medicament este destinat ca tratament suplimentar în anumite afecțiuni cardiace cronice (insuficiență cardiacă, după un infarct miocardic) și tulburări de ritm cardiac. În plus este folosit pentru a suplimenta aportul de potasiu și magneziu.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Panangin****Nu utilizați Panangin:**

- dacă sunteți alergic la aspartatul de potasiu anhidru sau la aspartatul de magneziu anhidru sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- dacă aveți insuficiență renală acută sau cronică
- dacă aveți boala Addison (insuficiență a cortexului suprarenal)
- dacă luați anumite medicamente pentru eliminarea apei numite diuretice antialdosteronice
- dacă aveți anumite tulburări de conducere cardiacă
- dacă aveți tensiune arterială extrem de scăzută, determinată de colaps circulator asociat cu incapacitatea inimii de a pompa suficient sânge (șoc cardiogenic).

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Panangin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Panangin comprimate filmate poate fi utilizat numai sub supraveghere medicală în tulburări posibil asociate cu un nivel ridicat de potasiu în sânge.

### **Panangin împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Tetraciclinele (anumite antibiotice) administrate oral, sărurile de fier și fluorura de sodiu inhibă absorbția Panangin. Trebuie să treacă minim 3 ore între ingestia acestor medicamente și administrarea de Panangin comprimate filmate.

Administrarea concomitentă de diuretice care economisesc potasiul și/sau inhibitori ECA (medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale) pot duce la un nivel ridicat de potasiu.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există date disponibile care să sugereze că acest preparat ar avea un efect nociv în aceste situații.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Panangin comprimate filmate nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. Cum să utilizați Panangin**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Cu excepția cazurilor în care medicul dumneavoastră a prescris altfel, doza uzuală este de 1 până la 2 comprimate filmate de trei ori pe zi.

Doza zilnică poate fi crescută la 3 comprimate filmate de trei ori pe zi. Aciditatea stomacului poate afecta eficiența tratamentului, astfel încât se recomandă administrarea Panangin după masă.

### **Dacă utilizați mai mult Panangin decât trebuie**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### *Ce să faceți după o cantitate mai mare de Panangin comprimate filmate*

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. În cazul în care ați luat o cantitate mai mare de Panangin, concentrația de potasiu și magneziu din sânge va crește și pot să apară manifestări clinice. Trebuie să încetați să luați Panangin dacă ați luat o cantitate mai mare.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Ca urmare a ingestiei unor doze mai mari, frecvența scaunelor poate crește.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## 5. Cum se păstrează Panangin

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, flacon și pe blister. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

### Ce conține Panangin

- Substanțele active sunt: aspartat de potasiu anhidru și aspartat de magneziu anhidru. Fiecare comprimat filmat conține aspartat de potasiu anhidru 158 mg (sub formă de aspartat de potasiu hemihidrat 166,3 mg) și aspartat de magneziu anhidru 140 mg (sub formă de aspartat de magneziu tetrahidrat 175 mg).
- Celelalte componente sunt: *nucleu* amidon de porumb, talc, stearat de magneziu, amidon de cartofi, Povidonă K-30, dioxid de siliciu coloidal anhidru; *film*: talc, copolimer butilatmetacrilic bazic (Eudragit E), dioxid de titan, Macrogol 6000.

### Cum arată Panangin și conținutul ambalajului

Panangin se prezintă sub formă de comprimate filmate, puțin lucioase, cu suprafața puțin inegală, diametrul de aproximativ 10 mm, de culoare aproape albă.

Cutie cu un flacon din PP, închis cu capac din PE, conținând 50 comprimate filmate.

Cutie cu 3 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 20 comprimate filmate.

Cutie cu 5 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 20 comprimate filmate.

### Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21, 1103 Budapesta, Ungaria

**Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2024.**