

Результаты исследования

Отношение к людям с психическими заболеваниями

2022



РАЗМЕР ВЫБОРКИ

1 093 интервью

СРОКИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Август 2022 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Мужчины и женщины 18+

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Россия, города 100 тыс.+

МЕТОД ОПРОСА


Онлайн-опрос по панели OMI,
выборка с предварительным отбором
по заданным параметрам

АНКЕТА

- 5 минут
- 14 вопросов

Параметры выборки


🌐 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (КВОТА)




♀ ПОЛ (КВОТА)




18+ ВОЗРАСТ (КВОТА)




💍 СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



📄 СТРАТА (КВОТА)




🛒 ДЕТИ



Параметры выборки


ОБРАЗОВАНИЕ



РОД ЗАНЯТОСТИ



ДОХОД



Знание о психических заболеваниях

Какие психические заболевания Вы знаете?

(открытый вопрос)

	TOTAL	Мужчины	Женщины	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-54 лет	55+ лет
Шизофрения/ шизоидные расстройства	65%	57%	71%	52%	59%	66%	68%	72%
Депрессия /депрессивные расстройства	19%	13%	25%	31%	25%	15%	15%	14%
Биполярное аффективное расстройство (БАР)	11%	7%	15%	23%	16%	8%	7%	8%
Аутизм/ РАС	9%	9%	10%	12%	12%	8%	9%	6%
Деменция	8%	6%	11%	4%	9%	8%	6%	12%
Невроз/невротические расстройства	6%	4%	8%	6%	7%	6%	7%	6%
Психоз/ другие виды психозов	6%	4%	8%	3%	6%	6%	7%	6%
Болезнь Альцгеймера	5%	5%	6%	4%	8%	2%	4%	7%
Эпилепсия	4%	4%	5%	2%	4%	4%	7%	4%
Паранойя	4%	4%	3%	2%	4%	4%	5%	3%
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)	3%	2%	4%	9%	5%	3%	1%	1%
Раздвоение личности	3%	3%	3%	3%	4%	3%	4%	1%
Олигофрения	3%	2%	4%	0%	1%	3%	5%	4%
Синдром Дауна	2%	4%	1%	1%	4%	2%	4%	1%
Алкогольный делирий (белая горячка)	2%	2%	3%	2%	2%	3%	1%	4%
Панические атаки	2%	1%	3%	4%	1%	2%	2%	3%
Фобии	2%	1%	2%	1%	2%	0%	3%	2%
Анорексия	2%	2%	2%	3%	2%	1%	0%	2%
Дебильность	2%	1%	2%	2%	0%	1%	2%	3%
Расстройство личности	2%	1%	2%	3%	2%	2%	1%	0%

База: • все респонденты • n=1093 • Ответы выведены от 2%


25% / 65% – значимо ниже / выше Total (на уровне значимости 0.95)

Самая высокая упоминаемость среди психических заболеваний у шизофрении (65%), ее упомянуло больше женщин и людей в возрасте 55+ лет. Следом идут депрессия (19%) и биполярное расстройство (11%), о них чаще говорили женщины и молодежь. Упоминаемость психических заболеваний в целом значимо выше среди женщин (16% мужчин vs 8% женщин затруднились ответить на этот вопрос).

Знание о психических заболеваниях

Какие психические заболевания Вы знаете?

(открытый вопрос)




База: • все респонденты • n=1093 • Ответы выведены от 2%

25% / 65% – значимо ниже / выше Total (на уровне значимости 0.95)

Среди группы тех, кто считает людей с психическими заболеваниями не опасными для общества, значимо выше доля тех, кто упоминал такие заболевания как депрессивные расстройства и биполярное аффективное расстройство.

Восприятие уровня опасности людей с психическими расстройствами для общества

По Вашему мнению, люди с психическими расстройствами опасны или не опасны для общества?




Большинство опрошенных (64%) считает, что люди с психическими расстройствами определённо представляют опасность или скорее опасны для общества.

8% считает, что такие люди скорее не опасны для общества, а 1% – что совсем не опасны.

Среди респондентов возраста 18-24 значимо больше доля тех, кто считает что такие люди совсем не опасны или скорее не опасны для общества.

Факторы, оказывающие влияние на отношение к людям с психическими расстройствами

Как Вы думаете, что могло бы повлиять на изменение Вашего мнения о людях с психическими расстройствами?




База: • все респонденты • n=1093

25% / 65% – значимо ниже / выше Total (на уровне значимости 0.95)

- Основной фактор, который, по мнению респондентов, мог бы повлиять на отношение к людям с психическими расстройствами – **«понимание симптоматики заболеваний и причин их возникновения» (50%)**.
- Мужчины в меньшей степени** воспринимают этот фактор как способ влияния на мнение о людях с психическими заболеваниями (45%).
- Младшая возрастная группа чаще** отмечают опыт сопереживания, подобный опыт среди знакомых и привлечение внимания со стороны знаменитостей как то, что могло бы повлиять на отношение к таким людям.
- 19% опрошенных отметили**, что ничего из перечисленного не могло бы повлиять на изменение их мнения.

Восприятие медикаментозного лечения как средства помощи людям с психическими заболеваниями


Оцените степень Вашего согласия со следующим высказыванием: «Медикаментозное лечение может помочь человеку с психическим заболеванием стать полноценным членом общества».



База: • все респонденты • n=696

25% / 65% – значимо ниже / выше Total (на уровне значимости 0.95)

ВСЯ ВЫБОРКА



TOP-2

- Полностью согласен(на)
- Скорее согласен(на)

BOTTOM-2


- Скорее НЕ согласен(на)
- Полностью НЕ согласен(на)
- Затрудняюсь дать оценку

43% опрошенных склонны согласиться с тем, что медикаментозное лечение может помочь человеку с психическими заболеваниями стать полноценным членом общества, почти такая же доля (39%) затруднились дать оценку.

Среди тех, кто считает, что люди с психическими расстройствами не опасны, выше доля согласившихся с утверждением (top-2 59%) и ниже доля затруднившихся дать оценку (19%).

Готовность помогать людям с психическими расстройствами

Насколько Вы сами готовы помогать людям с психическими расстройствами?



База: • все респонденты • n=1093

25% / 65% – значительно ниже / выше Total (на уровне значимости 0.95)

Как Вы думаете, чем Вы могли бы помочь людям с психическими расстройствами?




База: • респонденты, которые абсолютно или скорее готовы помочь • n=363

Мнения разделились примерно поровну: треть опрошенных (33%) скорее готовы или абсолютно готовы помочь людям с психическими расстройствами, 28% скорее не готовы или совсем не готовы помогать и 39% затруднились ответить на вопрос.

Большинство тех, кто готов помогать, считают, что нужно не замалчивать эту тему и обсуждать ее с родными и знакомыми (55%). Еще 36% среди тех, кто готов помогать людям с психическими заболеваниями, были бы готовы заниматься волонтерской работой.

Готовность помогать людям с психическими расстройствами – сравнение различных групп

Насколько Вы сами готовы помогать людям с психическими расстройствами?



Готовность помогать людям с психическими расстройствами выше среди молодых 18-24 (44%) и среди тех, кто не считает болеющих психическим заболеваниями опасными (58%).
В старших возрастных группах больше доля тех, кто не готов помогать таким людям.

64% В целом, людей с психическими заболеваниями чаще считают опасными для общества (64%). Меньше всего доля тех, кто не считает (или скорее не считает) таких людей опасными среди возрастной группы 18-24 (15%)

65% Чаще других люди указывают шизофрению/шизоидные расстройства (65%), остальные заболевания упоминают значительно реже (на втором месте депрессия 19%). Это может указывать на низкий уровень информированности и психических заболеваниях.

Шизофрению

значимо чаще упоминали респонденты в возрасте 55+ (72%) и женщины (71%).

Депрессию

чаще упоминали респонденты возраста 18-25 и 26-35 лет (31% и 25% соответственно), а также женщины (25%).

Аутизм

женщины (15%) и возрастная группа 18-24 (23%).

50% Основной фактор, который мог бы улучшить отношение к людям с психическими расстройствами в обществе – «понимание симптоматики заболеваний и причин их возникновения» – так ответили 50% опрошенных.

Возрастная группа 18-24 чаще отмечали опыт сопереживания, подобный опыт среди знакомых и привлечение внимания со стороны знаменитостей в качестве факторов, который могли бы изменить отношение к таким людям в обществе.

Мнения о помощи людям с психическими заболеваниями разделились примерно поровну:



58% Больше всего готовых помогать в группе тех, кто не считает людей с психическими заболеваниями опасными

44% Среди возрастных групп значимо чаще готова помогать молодежь 18-24

55% Большинство тех, кто готов помогать (55%) считают, что нельзя замалчивать эту тему и нужно обсуждать ее с родными и знакомыми

43%

«Медикаментозное лечение может помочь человеку с психическим заболеванием стать полноценным членом общества» – с этим утверждением полностью или частично согласны 43% опрошенных.

59%

Респонденты, которые не считают людей с психическими заболеваниями опасными для общества чаще соглашались (59%), что лечение может помочь таким людям стать полноценной частью общества.